

Liverpool Osteoarthritis in Dogs^{1,2} (LOAD) Questionnaire de suivi pour les propriétaires de chiens ayant des problèmes de mobilité



Date du jour :

Nom de l'animal :

Age de l'animal :

Sexe :

M F

TOTAL

Mobilité Généralement

1. Comment qualifieriez-vous la mobilité de votre chien en général ? (0) Très bonne (1) Bonne (2) Satisfaisante (3) Limitée (4) Très limitée
2. A quel point votre chien est-il handicapé par sa boiterie ? (0) Pas du tout handicapé (1) Légèrement handicapé (2) Modérément handicapé (3) Sévèrement handicapé (4) Extrêmement handicapé
3. Comment jugeriez-vous le niveau d'activité de votre chien ? (0) Extrêmement actif (1) Très actif (2) Modérément actif (3) Légèrement actif (4) Pas du tout actif
4. Quel est l'effet d'un temps froid et humide sur la boiterie de votre chien ? (0) Pas d'effet (1) Léger effet (2) Effet modéré (3) Effet sévère (4) Effet extrême
5. A quel point votre chien montre-t-il une raideur après être resté immobile, couché ? (0) Pas de raideur (1) Légère raideur (2) Raideur modérée (3) Raideur Sévère (4) Extrême raideur

Mobilité Lors de l'exercice

6. Lors de l'exercice, à quel point votre chien est-il actif ? (0) Extrêmement actif (1) Très actif (2) Plutôt actif (3) Pas très actif (4) Pas du tout actif
7. A quel point votre chien est-il désireux de faire de l'exercice ? (0) Extrêmement désireux (1) Fortement désireux (2) Plutôt désireux (3) Pas vraiment désireux (4) Pas du tout désireux
8. Comment jugeriez-vous la capacité de votre chien à faire de l'exercice ? (0) Très bonne (1) Bonne (2) Satisfaisante (3) Limitée (4) Très limitée
9. Quel impact a l'exercice sur la boiterie de votre animal ? (0) Pas d'effet (1) Effet moindre (2) Effet modéré (3) Effet sévère (4) Effet extrême
10. Combien de fois votre chien s'arrête ou s'assied lors de l'exercice ? (0) Jamais (1) Presque jamais (2) Parfois (3) Souvent (4) Très souvent
11. Quel est l'impact du temps froid et humide sur la capacité de votre animal de compagnie à faire de l'exercice ? (0) Aucun effet (1) Un effet léger (2) Un effet modéré (3) Un effet sévère (4) Un effet extrême
12. Suite à un exercice, votre animal se repose. Quand il se remet en activité, comment qualifieriez-vous sa raideur ? (0) Aucune raideur (1) Une raideur légère (2) Une raideur modérée (3) Une raideur sévère (4) Une raideur extrême
13. Quel est l'effet de la boiterie sur la capacité de votre chien à faire de l'exercice ? (0) Aucun effet (1) Un effet léger (2) Un effet modéré (3) Un effet sévère (4) Un effet extrême

SCORE TOTAL

1. Muller C, Gaines B, Gruen M, Case B, Arrufat K, Innes J, Lascelles BD, Evaluation of Clinical Metrology Instrument in Dogs with Osteoarthritis. J Vet Intern Med. 2016 May; 30(3):836-46
 2. Hercock CA, Pinchbeck G, Giejda A, et al, Validation of a client-based clinical metrology instrument for the evaluation of canine elbow osteoarthritis, Journal of Small Animal Practice 2009; 50: 266-271